




ทำอย่างไรอย่างไร? เมื่อถูกกัด ข่วน "ล้างแผล ใส่ยา ขังสัตว์ หามือ"

"สวัสดิ์แห่งพญานาค เมื่อถูกกัดไม่ประมาท"



#โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

หากถูกกัดแล้ว ควรปฏิบัติตนอย่างไร ?

1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด ฟอกสบู่เบาๆ ให้ถึงก้นแผล และล้างออกให้หมด (ถ้าจำเป็นเวลานาน 15 นาที) การล้างแผล จะช่วยลดปริมาณเชื้อได้ถึง **80%**
2. กายาบาดาตีบ และรีบมาพบแพทย์ โดยเร็วที่สุด เพื่อรับการรักษา และฉีดวัคซีนป้องกันโรค
3. กักสุนัขเพื่อดูอาการ **10 วัน** ถ้าตายให้นำซากมาตรวจ แต่ถ้าไม่ตาย แสดงว่าสุนัขตัวนั้นไม่ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า
4. ฉีดวัคซีนต่อให้ครบตามนัด และควรเข้ารับวัคซีน ให้ตรงตามที่แพทย์นัด

ป้องกันสุนัขกัด ได้อย่างไร ?

หลักคากา 5 ย. ได้แก่
“อย่าเหย อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง”

1. **อย่าเหย** ให้สุนัขโมโห
2. **อย่าเหยียบ** สุนัข หรือทำให้ตกใจ
3. **อย่าแยก** สุนัขที่กำลังกัดกัน ด้วยมือเปล่า
4. **อย่าหยิบ** ซามอาหาร หรือของที่สุนัขหวง
5. **อย่ายุ่ง** กับสุนัขจรจัด หรือสุนัขที่ไม่ทราบประวัติวัคซีน



 สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

กรมควบคุมโรค
 @line1422

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566


 กระทรวงสาธารณสุข
 กรมควบคุมโรค
 DEPARTMENT OF DISEASE CONTROL

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่งเกิดได้ใน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว โค กระบือ สุนัข รวมทั้งคน เมื่อได้รับเชื้อ หากปล่อยไว้จนเกิดอาการ จะเสียชีวิต ทุกราย แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

Rabies virus



ปัจจุบันยังไม่มียารักษา โรคพิษสุนัขบ้า



สัตว์ที่เป็น โรคพิษสุนัขบ้า มีอาการอย่างไร?



สัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า อาจแสดงอาการได้ 3 ระยะ ได้แก่

1. ระยะเริ่มแรก

มีอาการและนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม กินข้าว กินน้ำลดลง



2. ระยะตื่นเต้น

กระวนกระวาย ตื่นเต้น ไม่อยู่นิ่ง กัดทุกสิ่งไม่เลือก วังโล่กัดคนหรือสัตว์



3. ระยะอัมพาต

ค้างคาง สิ้นหายใจแสดงคล้ำ น้ำลายไหล ทรงตัวไม่ได้ เป็นอัมพาตและตาย ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะติดจากสัตว์ที่มีอาการเหล่านี้



ติดเชื่อได้ทางไหนบ้าง ?

สามารถติดเชื่อโรคพิษสุนัขบ้าได้ 2 ทาง คือ

1. ถูกกัดหรือข่วน ทำให้น้ำลายของสัตว์เข้าสู่ ร่างกายผ่านทางบาดแผล แม้แผลเพียงเล็กน้อย ก็สามารถติดเชื่อได้



2. ถูกเลียที่บาดแผล รอยถลอกหรือรอยขีดข่วน รวมทั้งริมฝีปากหรือเยื่อเมือก



อาการโรคพิษสุนัขบ้า เป็นอย่างไร ?

(ผู้ป่วยจะแสดงอาการ หลังได้รับเชื้อประมาณ 3 สัปดาห์ - 6 เดือน หรืออาจนานถึง 1 ปี)

- อาการเริ่มแรก: ไข้ต่ำ เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย และคันรุนแรงบริเวณแผลที่ถูกกัด
- อาการทางประสาท: กระสับกระส่าย คลุ้มคลั่ง กระวนกระวาย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง มีอาการหนาวสั่น กลืนลำบากโดยเฉพาะของเหลว
- อาการระยะสุดท้าย: กล้ามเนื้อเกร็ง - กระตุก แขนขาอ่อนแรง หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก หดสติและเสียชีวิตในที่สุด



5 ความเข้าใจผิด

เกี่ยวกับ

โรคพิษสุนัขบ้า



❌ โรคพิษสุนัขบ้าเกิดในฤดูร้อน

✅ **ความจริง** แล้วเกิดขึ้นได้ทุกฤดู แต่ในช่วงฤดูร้อน หมา แมว จะหงุดหงิดง่ายกว่าปกติ

❌ หมา แมว ที่มีเจ้าของ จะไม่เป็น โรคพิษสุนัขบ้า

✅ **ความจริง** หมา แมว มีเจ้าของ ก็สามารถติดเชื้อได้ เพราะมีโอกาส ไปสัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อ



❌ ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน ให้หมา แมว ทุกปี

✅ **ความจริง** จำเป็น หมา แมว ต้องฉีดวัคซีน ครั้งแรก 2 เข็ม ห่างกัน 2-4 สัปดาห์ และฉีดซ้ำ ทุกปี



❌ ลูกหมา ลูกแมว ที่มีอายุ น้อยกว่า 3 เดือน จะไม่เป็น โรคพิษสุนัขบ้า

✅ **ความจริง** ลูกหมา ลูกแมว ก็สามารถ ติดเชื้อได้ ตั้งแต่ ก่อนอายุ 3 เดือน



❌ เมื่อถูกกัด บ่วน หรือเลีย แค่ว่าแผลก็พอไม่ต้องรีบไปหาหมอ

✅ **ความจริง** หากถูกหมา แมว กัด บ่วน หรือเลีย ต้องรีบล้างแผล และไปพบแพทย์ทันที ที่สำคัญ ! ต้องฉีดวัคซีนให้ครบ จะช่วยป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้

โรคพิษสุนัขบ้า ไม่มียารักษา หากติดเชื้อเสียชีวิต 100%

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2568



FACEBOOK



WEBSITE



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9



The Office of Disease Prevention and Control 9

ถนนราชวิถี-โยธยา ตำบลคลองมีศาลา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
☎ 0 4421 2900 ต่อ 305
📠 0 4421 8018

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

